



PROTEGER HEALTH CARE  
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



# VACUNACIÓN ADULTOS

DISPONIBLE EN EL SERVICIO MÉDICO DE LA  
UNIVERSIDAD, EN NUESTRA SEDE Y A DOMICILIO

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)

 310 763 2253

 311 268 6178

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313. Bogotá

 @protegerhealthcare



# DENGUE

DOS DOSIS

\$ 330.000

VALOR POR DOSIS

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** Oscila entre 3 y 14 días, siendo usualmente de 3 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado.

**TRANSMISIÓN:** Los virus del dengue por lo general se propagan a las personas a través de las picaduras de mosquitos infectados de la especie Aedes. Una persona infectada de dengue durante el embarazo puede pasarle el virus al feto.

## DOS DOSIS

Primera dosis: A partir de los 4 años de edad

Segunda dosis: 3 meses de intervalo



# FIEBRE AMARILLA

UNA DOSIS

\$ 125.000

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 3 a 6 días.

**TRANSMISIÓN:** Se transmite por la picadura de mosquitos infectados, generalmente del género Aedes. La Fiebre Amarilla es una enfermedad hemorrágica de elevada mortalidad transmitida por varios mosquitos. La infección se caracteriza por fiebre súbita, escalofríos, cefalea, lumbalgias, dolores musculares, postración, náuseas e ictericia (coloración amarilla).

## UNA DOSIS

La edad mínima de aplicación son los 12 meses de vida y la edad máxima hasta los 59 años, 11 meses y 29 días

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



PROTEGER HEALTH CARE  
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



# INFLUENZA

DOSIS ANUAL

DISPONIBLE A  
PARTIR DE ABRIL

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 1 a 4 días. La mayoría de los adultos puede contagiar a otros a partir del 1º día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad.

**TRANSMISIÓN:** Tos - Estornudos. La Influenza (también conocida como "gripe") es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte.

**UNA DOSIS CADA AÑO**



# VARICELA

DOS DOSIS

\$ 195.000

VALOR POR DOSIS

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 14 a 21 días.

**TRANSMISIÓN:** Tos-Estornudos. La Varicela es altamente contagiosa, se transmite a través de las secreciones mucosas, de la tos y por contacto directo con las lesiones de la varicela.

## DOS DOSIS

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



# HERPES ZÓSTER

UNA DOSIS O DOS DOSIS

SHINGRIX - GSK VALOR POR DOSIS

\$ 958.000

NEXT PHARMA

\$ 590.000

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** No se puede desarrollar la culebrilla a menos que se haya tenido una exposición previa a la varicela. La culebrilla se produce cuando un factor agravante desconocido hace que el virus se active. A la mayoría de los adultos que tienen en el cuerpo el virus en estado latente nunca les da culebrilla.

**TRANSMISIÓN:** Se desarrolla en personas que han tenido varicela puesto que permanece en el sistema nervioso en estado inactivo. Generalmente, en personas mayores el virus se reactiva y el paciente desarrolla culebrilla, una erupción con ampollas que suele localizarse en una parte del cuerpo.

NO puede contagiarse de una persona a otra, quien lo padece sí puede transmitir a otras el virus varicela zóster mediante el contacto directo con las secreciones de las ampollas, que contienen el virus. Si la persona que se infecta por primera vez desarrollará varicela en lugar de herpes zóster.

## **APLICACIÓN: 1 o 2 DOSIS.**

**Laboratorio GSK - Shingrix - 2 dosis:** con intervalo entre 2 y 6 meses.

Para mayores de 18 años personas inmunosuprimidas o con enfermedades que afecten el sistema inmunológico.

**Laboratorio Next Pharma - 1 dosis:**

Para mayores de 40 años. No se puede aplicar a personas inmunosuprimidas.

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



PROTEGER HEALTH CARE  
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



# MENINGOCOCO

UNA DOSIS

\$ 230.000

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 3 a 7 días.

**TRANSMISIÓN:** Se transmite a través del contacto directo con secreciones respiratorias.

El Meningococo ocasiona infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal; la forma más amenazadora de la enfermedad es la septicemia; aproximadamente 1 de cada 5 sobrevivientes tienen secuelas como pérdida de la audición o discapacidad.

## PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

MENINGITIS CAUSADA POR NEISSERIA MENINGITIDIS DE SEROGRUPOS A-C-W-135-Y

UNA DOSIS PARA ADULTOS



# MENINGOCOCO B

UNA DOSIS

\$ 580.000

## PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

MENINGITIS CAUSADA POR NEISSERIA MENINGITIDIS DE SEROGRUPO B

UNA DOSIS PARA ADULTOS

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



# NEUMOCOCO 15

UNA DOSIS

\$ 225.000

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 1 a 3 días.

**TRANSMISIÓN:** Secreciones faríngeas y nasales.

El Neumococo es, la enfermedad inmunoprevenible que más mortalidad causa en el mundo. Puede conducir a infecciones serias de los pulmones (neumonía), la sangre (bacteremia), y el recubrimiento del cerebro (meningitis), entre otras.

## PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

NEUMONIA CAUSADA POR: Streptococcus pneumoniae serotipos 1,2,3,4,5, 6A, 6B, 7F,9V, 14, 18C, 19 A, 19F, 22 F y 23F

UNA DOSIS



# NEUMOCOCO 23

UNA DOSIS

\$ 165.000

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 1 a 4 días. La mayoría de los adultos puede contagiar a otros a partir del 1º día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad.

## PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

Protege contra 23 tipos de bacterias que causan la enfermedad neumocócica. Se aplica a partir de los dos años de edad; se recomienda todos los adultos de 65 años de edad o mayores, después de aplicar la vacuna Prevenar 13

UNA DOSIS

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



# VPH

## TRES DOSIS

\$ 690.000

VALOR POR DOSIS

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 6 meses a 2 años.

**TRANSMISIÓN:** Contacto Sexual. El Virus del Papiloma Humano es una enfermedad de transmisión sexual que afecta a mujeres y hombres. El VPH puede causar cáncer en los órganos reproductivos masculinos y femeninos, en la garganta, la lengua, las amígdalas y el cuello uterino.

### PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

9 tipos de Virus del Papiloma Humano

- \* Cáncer cervical, vulvar, vaginal y anal causado por VPH tipos 16,18,31,33,45,52 y 58
- \* Verrugas genitales (condiloma acuminado) causado por VPH tipos 6 y 11
- \* Lesiones precancerosas o displásicas causado por VPH tipos 6,11,16,18,31,33,45,52 y 58
- \* Cáncer anal causado por VPH tipos 16,18,31,33,45,52 y 58

Recomendada para hombres y mujeres a partir de los 9 años.

### TRES DOSIS

Primera dosis: inicial

Segunda dosis: 2 meses después recibe la segunda dosis.

Tercera dosis: 6 meses después de haberse aplicado la primera, se aplica la tercera dosis.

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



## DPaT

UNA DOSIS

\$ 138.000

### PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA

UNA DOSIS CADA DIEZ AÑOS



## TÉTANOS

TRES DOSIS + REFUERZO

\$ 29.500

VALOR POR DOSIS

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 24 horas a 54 días. Cuanto más alejado esté la herida del sistema nervioso central, más largo es el periodo de incubación. Los periodos de incubación y la probabilidad de muerte por tétanos son inversamente proporcionales.

**TRANSMISIÓN:** Heridas. El Tétanos es causado por una bacteria. La infección se contrae cuando las esporas penetran el organismo por causa de una lesión o herida. Las esporas liberan bacterias que se esparcen por el cuerpo y producen un tóxico que bloquea las señales nerviosas causando espasmos musculares intensos. Puede ser mortal.

### TRES DOSIS

Primera dosis: Al inicio de esquema de vacunación

Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

Tercera dosis: A los 6 meses de la segunda dosis

Primer refuerzo: Al año de la tercera dosis

Segundo refuerzo: Al año del primer refuerzo (unicamente para mujeres en edad fértil)

Un refuerzo cada 10 años

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



# TRIPLE VIRAL

UNA DOSIS

\$ 140.000

## PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

RUBÉOLA, PAPERAS Y SARAMPIÓN

UNA DOSIS



# HEPATITIS A+B

TRES DOSIS

\$ 199.500

VALOR POR DOSIS

## PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

HEPATITIS A Y HEPATITIS B

### TRES DOSIS Y UN REFUERZO

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

Tercera Dosis: A los seis meses de aplicada la primera dosis

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



# HEPATITIS B

TRES DOSIS + REFUERZO

\$ 57.800

VALOR POR DOSIS

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 75 días, pero puede oscilar entre 30 y 180 días.

**TRANSMISIÓN:** Saliva, sudor, lágrimas, orina, sangre. La Hepatitis B es una enfermedad contagiosa del hígado. La hepatitis hace que el hígado se inflame y deje de funcionar correctamente. Puede causar un proceso agudo que puede acabar en cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y la muerte.

## TRES DOSIS Y UN REFUERZO

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

Tercera Dosis: Al mes de aplicada la segunda dosis

Refuerzo: Al año de la primera dosis



# HEPATITIS A

DOS DOSIS

\$ 190.000

VALOR POR DOSIS

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** 14 y 28 días.

**TRANSMISIÓN:** La transmisión ocurre por la ingesta de agua o alimentos contaminados, persona a persona. La Hepatitis A es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la hepatitis A (VHA) caracterizada por una inflamación aguda del hígado.

## DOS DOSIS

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: A los 6 meses de aplicada la primera dosis

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



# FIEBRE TIFOIDEA

UNA DOSIS

\$ 160.000

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** Depende de la magnitud del inóculo y de factores del huésped; varía de 3 a más 60 días, por lo regular con límites de 8 a 14 días.

**TRANSMISIÓN:** La Fiebre Tifoidea es una enfermedad febril aguda grave que se desarrolla a partir de la ingestión de aguas, bebidas o alimentos contaminados. La principal manifestación es la gastroenteritis, que puede producir septicemia (infección).

**UNA DOSIS CADA 3 AÑOS**



# ANTIRRÁBICA

TRES DOSIS O CINCO DOSIS

\$ 198.000

VALOR POR DOSIS

**TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN):** Se extiende entre 3 y 8 semanas (en algunos casos hasta más de siete años). La media es de 45 días.

**TRANSMISIÓN:** Mordeduras y lamidos por animales infectados.

La Rabia es una enfermedad de origen viral que afecta a los mamíferos. Es transmitida al hombre por contacto, generalmente como resultado de mordeduras y/o lamidos por animales transmisores del virus. Se manifiesta bajo la forma de encefalitis aguda y su evolución es siempre fatal.

**Pre-exposición: (antes del contacto): TRES DOSIS.**

Una dosis inicial, a los siete días la segunda y a los veintiocho días la tercera.

**Post-exposición: (después del contacto): CINCO DOSIS.**

Día 0, 3, 7 14 y 21 días después del incidente.

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313  
Bogotá.

[www.protegerhealthcare.com](http://www.protegerhealthcare.com)



PROTEGER HEALTH CARE  
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



PROTEGER HEALTH CARE  
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA

 FLORMORADO  
 SANTA ANA  
MEDICAL CENTER

 310 763 2253

 311 268 6178

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313. Bogotá

 @protegerhealthcare